

Produit: Vitamina C Alcalina

Description

Ce complément contient une forme non acide de vitamine C, à base d'ascorbate de calcium, combinée à de puissants antioxydants pour soutenir le bon fonctionnement de l'ensemble du corps.



Fonction

Produit: Vitamina C Alcalina

Fonction

Por seu turno, a Naringina é um extraordinário flavonoide cítrico, que se pode encontrar na toranja e tem sabor amargo. Este flavonóide aumenta a secreção de suco pancreático e digestivo e aumenta a produção de suco gástrico.

Entre os principais efeitos da Naringina, destacam-se: - Contrariar os efeitos adversos da quimioterapia;

- Aumentar o metabolismo das gorduras;
- Diminuir o efeito negativo do consumo de álcool;
- Diminuir o risco de padecer de aterosclerose;
- Diminuir o nível de colesterol;
- Ajudar nas doenças vasculares, varizes e hemorróides;
- Apoiar o sistema imunitário, proteger a produção de hormonas, apoiar contra as infecções, limpar o intestino e ajudar à restauração da microflora e ser uma excelente prevenção contra resfriados e gripes.

Produit: Vitamina C Alcalina

Mode d'emploi / Précautions

Adultos devem tomar 2 cápsulas ao dia ou segundo prescrição profissional.
Não deve ser excedida a dose diária recomendada. Se tiver algum problema de saúde, consulte o seu médico primeiro. Os suplementos não devem substituir uma alimentação variada e equilibrada e um estilo de vida saudável. Não recomendado a menores de 18 anos, salvo quando prescrito/recomendado por médico/farmacêutico. Guardar em local fresco e seco. Manter fora do alcance das crianças.



Conditionnement

- Format : 100cc
- Poids net : 37,5g
- Poids total:
- Type : cápsulas
- Quantité : 60
- N.º embalagens p/caixa:
- IVA 23%
- Référence : ECO VIT C ALCALINA
- Code-barres : 5600283759098

Indications

A Vitamina C Alcalina pode ser um suplemento alimentar útil para aqueles que desejam complementar sua dieta com esta mistura única, de vitamina C não-ácida, bioflavonóides cítricos, Hesperidina e Naringina. Os seus principais benefícios são: combater os radicais livres, ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares, favorecer a saúde ocular, reduzir os sintomas gripais, melhorar a qualidade e aspecto da pele, cabelo e unhas, promover a redução dos níveis maus de colesterol (LDL).

Allergènes

Não contém qualquer Type de alergénicos.



***%VRN: Valor de Referência de Nutrientes**

Produit: Vitamina C Alcalina

Informação sobre constituintes

Naringina: A naringina ou (4, 5, 7-trihidroxi-flavanona-7-ramnoglucósido), é um flavonóide, uma flavona glicosídica presente nos cítricos.

É extraída principalmente da casca dos cítricos, mas também se encontra, embora em pequenas Quantités, na polpa, sumo, folhas, flores e sementes da planta. Ela dá o sabor amargo aos cítricos. A concentração de naringina depende do Type de cítrico e dentro de cada variedade, depende de quão maduro o fruto está, sendo mais abundante nas frutas pouco maduras.

As frutas cítricas que contêm naringina também costumam conter outros ingredientes como diferentes flavonóides, limonóides, e pectinas, com efeitos protectores da saúde. O cítrico com maior proporção de naringina é a toranja.

À naringina são atribuídas muitas propriedades saudáveis em relação à síndrome metabólica (SM). São numerosos os estudos que corroboram a interacção entre a ingestão de naringina e a melhoria dos sintomas da SM, sendo que esta corrige transtornos metabólicos vinculados com a resistência à insulina, previne as hiperinsulinemias em resistentes à insulina e as dislipidemias induzidas pela dieta: os efeitos metabólicos positivos da naringina foram observados inclusive em casos de dietas elevadas em gorduras e colesterol.

Em estudos pré-clínicos para diabetes Type 2, a naringina demonstrou possuir propriedades similares a da insulina como a de reduzir lípidos, atenuar a resistência à insulina, a disfunção das células β , esteatose hepática e o dano renal.

Hesperidina: A Hesperidina é um fitoterápico de estrutura glicosídeo-flavonoídica, conhecido também como vitamina P ou citrina. É um protetor vascular que atua sobre a parede dos capilares e sobre a permeabilidade dos endotélios, resultando numa atividade antiinflamatória e antiexsudativa. Também possui atividade antioxidante por impedir a oxidação do LDL.

A associação da Hesperidina com vitamina C melhora sua ação e diminui a fragilidade capilar. É uma substância natural encontrada em abundância no mesocarpo (porção branca) dos limões e das laranjas verdes, podendo ser encontrada também nas uvas, ameixa, mamão, própolis e Gingko biloba. A hesperidina tem uma acção muito importante sob o sistema vascular, normalizando a circulação e aumentando a resistência dos vasos sanguíneos.

Produit: Vitamina C Alcalina

Bibliographie

- Frech T, Clegg D.: Current Rheumatology Reports [serial online]. April 2007;9(1):25-30.
- Henriksson P, Diczfalussy U, Freyschuss A.: Microcirculation (New York, N.Y.: 1994) [serial online]. January 2012;19(1):86-93.
- Desneves K, Todorovic B, Cassar A, Crowe T.: Clinical Nutrition (Edinburgh, Scotland) [serial online].December 2005;24(6):979-987.
- Maggini S, Beveridge S, Suter M.: The Journal of International Medical Research [serial online]. 2012;40(1):28-42.
- Yang M, Collis C, Kelly M, Diplock A, Rice-Evans C.: European Journal Of Clinical Nutrition [serial online].Chew EY, et al. Ophthalmology. 2013 Aug;120(8):1604-11.e4.
- Benavente-García O, Castillo J.: Journal Of Agricultural And Food Chemistry [serial online]. August 13,2008;56(15):6185-6205. - Vinciguerra G, Belcaro G, Cornelli U, et al.: The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness [serial online].December 2013;53(6):644-654.
- Bendich A, Langseth L.: J Am Coll Nutr 1995;14:124-136.
- Berkarda B, Koyuncu H, Soybir G, Baykut F.: Res Exp Med (Berl) 1998 Aug;198(2):93-9.
- Bush MJ, Verlangieri AJ.: Res Commun Chem Pathol Pharmacol 1987;57:137-140.
- Cunningham JJ, Mearkle PL, Brown RG.: J Am Coll Nutr 1994;13:344-350.
- Edwards DJ, Bernier SM.: Life Sci 1996;59(13):1025-30.
- Eriksson J, Kohvakka A.: Ann Nutr Metab 1995;39:217-223.
- Faruque MO, Khan MR, Rahman M, Ahmed F.: Br J Nutr 1995;73:625-632.
- Franke AA, Cooney RV, Custer LJ, et al.: Adv Exp Med Biol 1998;439:237-48.
- Frei B.: Am J Med 1994;97 Suppl. 3A:5S-13S.
- Gale CR, Martyn CN, Winter PD, Cooper C.: BMJ 1995;310:1563-1566.
- Ghosh SK, et al.: Gerontology 1994;40:268-272.
- Green MHL, et al. Mutat: Res DNAAging Genet Instability Aging 1994;316:91-102.
- Grimm T, Schafer A, Hogger P.: Free Radic Biol Med. 2004 Mar 15;36(6):811-22.
- Gruenwald J, Graubaum HJ, Busch R, Bentley C.: Adv Ther. 2006 Jan-Feb;23(1):171-8.
- Guilhou JJ, Fevrier F, Debure C, et al.: Int J Microcirc Clin Exp 1997;17 Suppl 1:21-6.
- Lehr H-A, Frei B, Arfors K-E.: Proc Natl Acad Sci USA 1994;91:7688-7692.
- Miyake Y, Yamamoto K, Tsujihara N, Osawa T.: Lipids 1998 Jul;33(7):689-95.
- Mukhopadhyay CK, Chatterjee IB.: J Biol Chem 1994;269:30200-30205.
- Paolisso G, Balbi V, Volpe C, et al.: J Am Coll Nutr 1995;14:387-392